სსიპ გარემოს
ეროვნული სააგენტო

დავით აღმაშენებლის გამზირი №150
0112 თბილისი, საქართველო
+995 32 2439503 / +995 32 2439510
info@nea.gov.ge
https://nea.gov.ge/

აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი

2026 წელი

№30 ოქტომბრის მესამე დეკადა

გამოდის 1931 წლიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სარჩევი

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი 1
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარება და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები.....
2026 წლის ოქტომბრის მესამე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები .....
აღმოსავლეთ საქართველო .....
დასავლეთ საქართველო 13

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი

ოქტომბრის მესამე დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე ძალზე თბილი; დასავლეთ საქართველოში ნალექიანი, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში უხვნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა.

ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურა მრავალწლიურ მაჩვენებელთან შედარებით დასავლეთ საქართველოში 5^0, შიდა ქართლში 4^0, ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში კი 3^0-ით მაღალი აღმოჩნდა და შეადგინა: 14-19^0 დასავლეთ საქართველოში, 13-14^0 აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, 9-11^0 აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 23-27^0, აღმოსავლეთ საქართველოში 15-22^0 -ის ფარგლებში მერყეობდა.

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 6-14^0, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 4-10^0, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში 0-5^0-ის შუალედში ფიქსირდებოდა.

ნალექები განვლილ დეკადაში დასავლეთ საქართველოში 3-4, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 6-9 დღის განმავლობაში მოდიოდა და მათი ჯამი ასე განაწილდა: 15-98მმ (მრავალწლიური ნორმის 34-109%) დასავლეთ საქართველოში, 22-84მმ (მრავალწლიური ნორმის 100-764%) აღმოსავლეთ საქართველოში.

ძლიერი ქარი (15 მ/წმ-ში და მეტი სიჩქარით) ქროდა 2-5 დღის განმავლობაში ქვეყნის ცალკეულ რაიონებში.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარებისა და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები

დასავლეთ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები კარგ პირობებში ტარდებოდა. იკრიფებოდა ხილი და ბოსტნეული. ციტრუსებზე ნაყოფში შაქრის დაგროვებისათვის ხელსაყრელი პირობები იყო. მანდარინზე ნაყოფის შერჩევითი კრეფა მიმდინარეობდა.

აღმოსავლეთ საქართველოში უხვი ნალექი აფერხებდა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს, გაძნელებული იყო ნიადაგის ხვნა.

მთიან ზონაში განვლილი დეკადის უხვნალექიანი ამინდი ხელს უშლიდა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს.


აღმოსავლეთ საქართველოს ზამთრის საძოვრებისაკენ საქონლის გადარეკვა არ დასრულებულა.


დანართი


2026 წლის ოქტომბრის მესამე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები


სადგური	ჰაერის ტემპერატურა C⁰				მინიმალური ტემპერატურა ნიადაგის ზედაპირზე	ნალექები			ნალექიან დღეთა რიცხვი		დღეთა რიცხვი ქარით 15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით	ჰაერის საშუალო დეკადური შეფარდებითი ტენიანობა, %
	საშუალო დეკადური	გადახრა ნორმიდან მაქსიმალური	მაქსიმალური	მინიმალური		რაოდენობა მმ	რაოდენობა ნორმიდან %-ში	დღეღამური მაქსიმუმი	1 მმ და მეტი	5 მმ და მეტი		
ქობულეთი	18.3	4.8	27	10		98	109	64	3	2	3	
ზუგდიდი	18.7	4.6	27	9		26	45	18	2	2		
ქუთაისი	18.8	4.7	25	12	11	17	34	9	4	2	5	67
ზესტაფონი	17.9	4.5	25	14		15	35	8	3	2	2	
საჩხერე	15.4	5.2	25	6		15	43	11	3	1		
ამბროლაური	14.3	4.6	23	6		17	43	3	1			
ხაშური(აგარა)	13.0	4.3	20	4		22	100	11	3	2		
გორი	13.5	4.0	22	8	5	35	219	25	4	2	2	93
თიანეთი	10.2	3.4	20	5		54	300	15	7	5		
ფასანაური	9.8	2.5	18	2		27	135	14	5	2		
თბილისი	14.3	2.8	20	9	8	84	764	38	8	4		90
საგარეჯო	12.6	2.8	19	10		56	267	23	6	4		
დედოფლისწყარო	12.5	3.4	19	9		68	425	20	7	6		
თელავი	13.7	3.1	22	8		55	306	18	7	3		
ბოლნისი	13.9	2.9	21	8	6	59	454	12	9	5		73
ახალციხე	10.7	3.2	21	1	1	47	336	20	7	3		85
წალკა	8.5	3.2	15	3		26	153	9	6	2		
ახალქალაქი	8.5	3.4	19	0		53	331	16	6	4		


აღმოსავლეთ საქართველო









ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ბაკურიანში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
20.8
17.8
14.8
11.8
8.8
5.8
2.8
-0.2
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
აგარაში (ხაშურში) ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
22.4
19.4
16.4
13.4
10.4
7.4
4.4
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
გორში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
22.5
19.5
16.5
13.5
10.5
7.5
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
თიანეთში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
22.0
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
4.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ფასანაურში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
5.0
2.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pmm) მსვლელობა
დუშეთში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
4.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
თბილისში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
23.0
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ბოლნისში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
22.0
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pmm) მსვლელობა
მარნეულში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
23.0
21.0
19.0
17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
წალკაში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები


ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
საგარეჯოში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
თელავში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
22.0
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
დედოფლისწყაროში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pmm) მსვლელობა
ლაგოდეხში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები





დასავლეთ საქართველო






ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ხულოში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
25.0
22.0
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ფოთში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
28.0
25.0
22.0
19.0
16.0
13.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ზუგდიდში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
26.0
23.0
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ქუთაისში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
26.0
23.0
20.0
17.0
14.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები


ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ზესტაფონში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
15.0
13.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები


ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
საჩხერეში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
26.0
23.0
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
5.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები


ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
მთა საბუეთში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
16.0
13.0
10.0
7.0
4.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები



ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
ამბროლაურში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
25.0
22.0
19.0
16.0
13.0
10.0
7.0
4.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები


ჰაერის ტემპერატურის (T) და ნალექების (Pმმ) მსვლელობა
შოვში ოქტომბრის III დეკადაში
T
Pმმ
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pmm
Tmax
Tmin
დღეები

თემატური აგრომეტეოროლოგიური რუკები და მათი განმარტებები
სეზონური ინდიკატორები


სახნავი მიწები

სასოფლო-სამეურნეო სტრესის ინდექსი (ASI – Agricultural Atress Index) არის ინდიკატორი, რომელიც მაღალი ალბათობით ასახავს, სახნავ მიწებზე ნიადაგში ტენის ნაკლებობის (გვალვის) ადრეულ გამოვლინებას. ინდექსი ემყარება მცენარეულობის ჯანმრთელობის ინდექსის ორი გაზომვის ინტეგრაციას (გაერთიანებას), რაც აუცილებელია სოფლის მეურნეობაში გვალვის ალბათობის შესაფასებლად, როგორც დროით, ისე სივრცით განფენილობაში. პირველი ნაბიჯი ASI– ის გაანგარიშებისას VHI (Vegetation Health Index)– ის საშუალო შეფასებაა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მშრალი პერიოდის (გვალვის) ინტენსივობისა და ხანგრძლივობის შეფასებით, რაც შეიძლება მოხდეს სავეგეტაციო პერიოდის კონკრეტულ ეტაპზე. მეორე ეტაპზე, გვალვის შემთხვევების მასშტაბი განისაზღვრება სახნავი ზონებში პიქსელის (წერტილების) პროცენტული გამოანგარიშებით. VHI-ი მნიშვნელობით 35% და ქვემოთ (ნაკლები) (ეს მნიშვნელობა გამოიკვეთა 1995 წელს ფ. კოგანის გამოკვლევით), მიღებულია როგორც კრიტიკული ბარიერი გვალვის მასშტაბის განსაზღვრისას. ანალიტიკოსების მიერ შედეგების სწრაფი ინტერპრეტაციის გასაადვილებლად, თითოეული ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია კლასიფიცირდება დაზარალებული ტერიტორიების პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით.




გვალვის ინტენსივობა

სასოფლო-სამეურნეო გვალვა გამოვლინების ინტენსივობის მიხედვით კლასიფიცირდება ოთხ კლასად: ექსტრემალური, ძლიერი, საშუალო და სუსტ გვალვად. გვალვის ინტენსივობა გამოითვლება მცენარეთა ჯანმრთელობის ინდექსის საშუალო წონითი მაჩვენებლიდან, რომელიც აგრეგირებულია (დაჯამებულია) რეგიონების მიხედვით. რაც უფრო ცუდია მცენარეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მით უფრო ძლიერია გვალვა.



მცენარეულობის ჯანმრთელობის საშუალო ინდექსი
The Mean Vegetation Health Index (Mean VHI)

მცენარეულობის ჯანმრთელობის საშუალო ინდექსი (Mean VHI) მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს გვალვის ხარისხი სავეგეტაციო პერიოდის დაწყებიდან, მცენარეთა მდგომარეობის შესწავლით და ჰაერის ტემპერატურის გავლენით მცენარეთა მდგომარეობაზე. VHI -ის საშუალო მნიშვნელობა, წარმოადგენს VHI -ის საშუალო დეკადურ მნიშვნელობას სავეგეტაციო პერიოდის დაწყებიდან მოცემულ დღემდე (დეკადამდე). ის მხედველობაში იღებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მგრძნობიარობას ტენის სტრესისადმი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში და გამოითვლის ტენის დეფიციტის (გვალვის) დროით გავლენას სავეგეტაციო პერიოდის დაწყებიდან, მიმდინარე დეკადამდე.




სამოვრები


სასოფლო-სამეურნეო სტრესის ინდექსი (ASI – Agricultural Atress Index)

სასოფლო-სამეურნეო სტრესის ინდექსი (ASI) - ეს არის გვალვის სწრაფი გამოვლინების ინდიკატორი, რომელიც აადვილებს მაღალი ალბათობით სწრაფად იქნეს გამოვლენილი გვალვიანი ნათესი ფართობები. ინდექსი დაფუძნებულია მცენარეთა ჯანმრთელობის ინდექსის ორგანზომილებიან ინტეგრაციაზე, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გვალვის შეფასებისათვის სოფლის მეურნეობაში: დროითი და სივრცობრივი. სასოფლო-სამეურნეო სტრესის ინდექსის გამოთვლის პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს მცენარეთა ჯანმრთელობის ინდექსის VHI დროითი გასაშუალოება, რომლის შედეგად ხდება გვალვიანი პერიოდების გამოვლინების ინტენსივობების და ხანგრძლივობის შეფასება, მცენარეთა განვითარების ციკლების შესაბამისად, პიქსელის დონეზე (პიქსელი არის წერტილის ფართობი სხვადასხვა მასშტაბის რუკაზე). ეს გამოთვლები შეიცავს წყლისადმი მცენარეთა სტრესის კოეფიციენტებს თითოეული ფენოლოგიური ფაზისათვის. გამოთვლების მეორე ეტაპზე განისაზღვრება გვალვის სივრცითი განფენილობა სახნავ მიწებზე პიქსელების პროცენტის განსაზღვრით, რომელთა VHI-ინდექსი ნაკლებია 35 პროცენტზე. (ე.ი. გამოიყოფა იმ ფართობების პროცენტული რაოდენობა, სადაც VHI-ინდექსი ნაკლებია 35 პროცენტზე).


(ეს მნიშვნელობა მიღებული იქნა კრიტიკულ ზღვრად გვალვის ხარისხის შეფასების დროს (Kogan,1995). იმისათვის, რომ გაადვილდეს შედეგების სწრაფი ინტერპრეტაცია, თითოეული ადმინისტრაციული ზონა კლასიფიცირდება დაზიანებული ტერიტორიის პროცენტული წილის შესაბამისად.



გვალვის ინტენსივობა




მცენარეულობის ჯანმრთელობის საშუალო ინდექსი



სავეგეტაციო ინდიკატორები


ნორმალიზებული სხვაობის მცენარეულობის ინდექსი (**NDVI- The Normalized Difference Vegetation Index)** განსაზღვრავს ნიადაგის საფარის *სიმწვანეს* და გამოიყენება, როგორც ინდიკატორი, რომელიც მიუთითებს მცენარეულობის სიმჭიდროვესა და მის მდგომარეობას. NDVI-ის მნიშვნელობები +1 – დან -1 – მდე მერყეობს, მაღალი პოზიტიური მნიშვნელობები შეესაბამება მჭიდრო და ჯანმრთელ მცენარეულობას, ხოლო NDVI-ის დაბალი ან / და უარყოფითი მნიშვნელობები მიუთითებს მცენარეულობის განვითარების ცუდ პირობებზე ან მეჩხერ მცენარეულობაზე. NDVI-ის ანომალია მიუთითებს მიმდინარე დეკადაში გრძელვადიან საშუალოსთან სხვაობაზე. სხვაობის დადებითი მნიშვნელობა (მაგ., 20 პროცენტი) ნიშნავს მცენარეულ პირობების გაუმჯობესებას საშუალოსთან შედარებით, ხოლო ნეგატიური მნიშვნელობა (მაგ. -40 პროცენტი) მიგვანიშნებს მცენარეულობის შედარებით ცუდ მდგომარეობაზე. Difference to LTA (Long Term Average) - სხვაობა მრავალწლიური საშუალოსთან მიმართებით;



Normal – ნორმალური, საშუალო;
Missing –მონაცემი არ არის;
Clouds – ღრუბლები;
Snow - თოვლი.

მცენარეულობის მდგომარეობის ინდექსი (VCI – Vegetation Condition Index)


აფასებს მცენარეულობის ამჟამინდელ (მიმდინარე) მდგომარეობას ისტორიულ ტენდენციასთან შედარებით. VCI უკავშირებს (ადარებს), მიმდინარე მცენარეულობის ნორმალიზებული სხვაობის ინდექსს (NDVI- **The Normalized Difference Vegetation Index**) მის გრძელვადიან მინიმალურ და მაქსიმალურ მაჩვენებლებთან, იმავე დეკადაში. VCI იმისათვის შეიქმნა, რომ NDVI-ის ამინდთან დაკავშირებული კომპონენტი გამოყოფილი იქნეს გარემოს სხვა ფაქტორებისგან.



მცენარეულობის ჯანმრთელობის ინდექსი (VHI-Vegetation Health Index)


გვიჩვენებს გვალვის სიმწვავეს, რომელიც დაფუძნებულია მცენარეულობის ჯანმრთელობასა და მცენარეულობაზე ჰაერის ტემპერატურის გავლენაზე. VHI არის კომპოზიციური ინდექსი და ელემენტარული მაჩვენებელი, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო (მცენარეულობათა) სტრესის ინდექსის, ASI– (Agricultural Stress Index) - ის გამოსათვლელად. იგი აერთიანებს როგორც მცენარეულობის მდგომარეობის ინდექსს (VCI), ასევე ჰაერის ტემპერატურული პირობების ინდექსს (TCI – Temperature Condition Index). TCI გამოითვლება VCI- ის მსგავსი განტოლების გამოყენებით, მაგრამ ჰაერის მიმდინარე ტემპერატურა ასოცირდება, უკავშირდება მის გრძელვადიან მაქსიმალურ და მინიმალურ მაჩვენებლებს, რადგან ითვლება, რომ მაღალი ტემპერატურა ნიადაგში ტენიანობის შემცირებას იწვევს. მაგალითად, VHI– ის შემცირება (კლება), ნიშნავს მცენარეულობის შედარებით ცუდ მდგომარეობას და ჰაერის უფრო მაღალ ტემპერატურას, რაც მცენარეულობის ჯანმრთელობის გაუარესებაზე მიანიშნებს.

მცენარეულობის აღნიშნული მდგომარეობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიანიშნებს გვალვაზე. VHI გამოსახულებები გამოითვლება ორი ძირითადი სეზონისთვის და სამი მოდულისთვის: ათდღიანი, თვის და წლის.



ნალექების შეფასება

რუკაზე ნაჩვენებია მიმდინარე დეკადის განმავლობაში (10-დღიანი პერიოდი) აკუმულირებული, შეჯამებული ნალექის რაოდენობა მმ-ში. აღნიშნული მონაცემები მიღებულია ECMWF სისტემისგან.



ნალექების ანომალია

რუკაზე მოცემულია სხვაობა მიმდინარე დეკადაში მოსული ნალექების ჯამსა და მრავალწლიურ საშუალო მაჩვენებელს შორის. ნალექების რაოდენობა შედარებულია 1989-2015 წლების პერიოდთან.

